ACARI

di interesse apistico in Italia

Nome comune

VARROA

Nome latino

Varroa destructor
(Varroidae)

Vista ventrale

Morfologia

Dimorfismo sessuale.

- **Femmina** di forma **appiattita-ellissoidale**, colore **bruno rossiccio**, tegumento più sclerificato.
- **Maschio** di forma più **rotondeggiante**, colore **bianco-grigiastro**.

Femmina 1,1-1,3 x 1,5-1,8 mm
Maschio: 0,75 x 0,8 mm

TROPILAEELAPS

Tropilaelaps spp.
(Laelapidae)

- **Corpo allungato.**

Locomozione rapida.

Classificazione: questo genere comprende quattro specie morfologicamente molto simili tra loro: *T. mercedesae*, *T. clareae*, *T. thaili* e *T. kaenigerum*.

L'identificazione di specie viene confermata attraverso tecniche di biologia molecolare.

1 mm x 0,6 mm

Alimentazione e ciclo vitale

Covata e api adulte (capace di forare la cuticola).

Può sopravvivere in assenza di covata per periodi prolungati (1-2 mesi).

Durata del ciclo vitale: **10-12 giorni**

Covata (incapace di forare la cuticola di api adulte).

Sopravvive pochi giorni (1-3) su api adulte (la breve fase foretica limita la diffusione dell'acaro).

Durata del ciclo vitale: **6-9 giorni**

Ospite principale e dove si trova nell'alveare

Apis mellifera

Nell'alveare si trova **sulle api adulte e nella covata**

Apis dorsata, Apis laboriosa e Apis breviligula

Le specie *T. clareae* e *T. mercedesae* possono parassitare anche **Apis mellifera**.

Nell'alveare si trova **principalmente nella covata**.

Esemplare di *Tropilaelaps* spp. (a sinistra) e due esemplari di *Varroa destructor* (a destra) su larva di *A. mellifera*

Sintomi clinici dell'infestazione

Varroa destructor funge da vettore per diversi virus, aggravando ulteriormente lo stato di salute della colonia di api.

Api adulte:

debolezza generale; ali, zampe e antenne deformate e/o atrofizzate; addome più corto e deforme e pupe con macchie scure.

Covata:

morte di molte larve di api che determinano un aspetto della covata irregolare e non compatto, con larve morte che possono parzialmente sporgere dalle celle. Gli opercoli possono essere forati come risultato delle attività di pulizia delle api operaie. Cannibalismo su larve o pupe morte di covata opercolata/pupe/api a termine (con la testa che emerge dalla cella, con la ligula estroflessa). Larve morte di colore marrone o marrone chiaro (senza l'aspetto filante tipico della peste americana) e larve secche.

LA SUA PRESENZA NEL MONDO

- **Tropilaelaps spp.**
Asia-Indonesia (clima tropicale-subtropicale)
Georgia (2024) e Russia (2021)

Il rischio di diffusione e insediamento di questo acaro in nuove aree sta aumentando a causa della movimentazione di api e di materiale apistico sempre più frequente e rapida. Inoltre, il cambiamento climatico potrebbe giocare un ruolo determinante nella diffusione di questo acaro.

Parassita esotico per l'Unione Europea. In caso di sospetto contattare immediatamente i Servizi Veterinari territorialmente competenti.

- **Varroa destructor**
Distribuzione **mondiale** (clima temperato-tropicale).
Presente in Europa dagli anni '70. Segnalato per la prima volta in **Italia** nel 1981 e **considerato endemico su tutto il territorio nazionale** dal 1983.
Soggetto a piano di controllo e sorveglianza nazionale.

La prima cosa da fare è contattare i Servizi Veterinari territorialmente competenti.